

# MUH1G3/ MATRIKS DAN RUANG VEKTOR

TIM DOSEN



5

**Ruang Vektor**

# Ruang Vektor

## **Sub Pokok Bahasan**

- Ruang Vektor Umum
- Subruang
- Basis dan Dimensi

## **Beberapa Aplikasi Ruang Vektor**

- Beberapa metode optimasi
- Sistem Kontrol
- Operation Research
- dan lain-lain

# Ruang Vektor Umum

Misalkan  $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in V$  dan  $k, l \in R$

$V$  dinamakan ruang vektor jika memenuhi aksioma:

- ▶ untuk setiap  $\vec{u}, \vec{v} \in V$  maka  $\vec{u} + \vec{v} \in V$   
( $V$  tertutup terhadap operasi penjumlahan)
- ▶  $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$
- ▶  $\vec{u} + (\vec{v} + \vec{w}) = (\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w}$
- ▶ Terdapat  $\vec{0} \in V$  sehingga untuk setiap  $\vec{u} \in V$  berlaku  $\vec{u} + \vec{0} = \vec{0} + \vec{u} = \vec{u}$

## Ruang Vektor Umum\_2

- ▶ untuk setiap  $\vec{u} \in V$  terdapat  $-\vec{u}$  sehingga  
$$\vec{u} + (-\vec{u}) = (-\vec{u} + \vec{u}) = \vec{0}$$
- ▶ untuk setiap  $\vec{u} \in V$  dan  $k \in R$  maka  $k\vec{u} \in V$   
( $V$  tertutup terhadap operasi perkalian dengan scalar)
- ▶  $k(\vec{u} + \vec{v}) = k\vec{u} + k\vec{v}$
- ▶  $(k + l)\vec{u} = k\vec{u} + l\vec{u}$
- ▶  $k(l\vec{u}) = l(k\vec{u}) = (kl)\vec{u}$
- ▶  $1\vec{u} = \vec{u}$

## Contoh Ruang Vektor:

### Contoh :

- Himpunan vektor Euclides dengan operasi standar (operasi penjumlahan dan operasi perkalian dengan skalar).  
Notasi :  $R^n$  (Ruang Euclides orde  $n$ )
- Himpunan matriks berukuran  $m \times n$  dengan operasi standar (penjumlahan matriks dan perkalian matriks dengan skalar),  
Notasi :  $M_{m \times n}$  (Ruang Matriks  $m \times n$ )
- Himpunan polinom pangkat  $n$  dengan operasi standar.  
Notasi :  $P_n$  (Ruang Polinom orde  $n$ )

## Ruang Euclides orde $n$

► Operasi-operasi pada ruang vektor Euclides:

- Penjumlahan

$$\vec{u} + \vec{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, \dots, u_n + v_n)$$

- Perkalian dengan scalar Riil sebarang ( $k$ )

$$k\vec{u} = (ku_1, ku_2, \dots, ku_n)$$

- Perkalian titik (Euclidean inner product)

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + \dots + u_nv_n$$

Panjang vektor didefinisikan oleh:

$$\|\vec{u}\| = (\vec{u} \cdot \vec{u})^{\frac{1}{2}} = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + \dots + u_n^2}$$

Jarak antara dua vektor didefinisikan oleh:

$$d(\vec{u}, \vec{v}) = \|\vec{u} - \vec{v}\| = \sqrt{(u_1 - v_1)^2 + (u_2 - v_2)^2 + \dots + (u_n - v_n)^2}$$

## Contoh:

- ▶ Diketahui  $\vec{u} = (1, 1, 2, 3)$  dan  $\vec{v} = (2, 2, 1, 1)$   
Tentukan panjang masing-masing vektor dan jarak antara kedua vektor tersebut

## Jawab:

- ▶ Panjang vektor:

$$\|\vec{u}\| = (\vec{u} \cdot \vec{u})^{\frac{1}{2}} = \sqrt{1^2 + 1^2 + 2^2 + 3^2} = \sqrt{15}$$

$$\|\vec{v}\| = (\vec{v} \cdot \vec{v})^{\frac{1}{2}} = \sqrt{2^2 + 2^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{10}$$

- ▶ Jarak antar kedua vektor:

$$\begin{aligned} d(\vec{u} - \vec{v}) &= \|\vec{u} - \vec{v}\| = \sqrt{(1 - 2)^2 + (1 - 2)^2 + (2 - 1)^2 + (3 - 1)^2} \\ &= \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2 + (1)^2 + (2)^2} = \sqrt{7} \end{aligned}$$

## SubRuang

- ▶ Misal  $W$  merupakan subhimpunan dari sebuah ruang vektor  $V$   
 $W$  dinamakan subruang (subspace)  $V$  jika  $W$  juga merupakan ruang vektor yang tertutup terhadap operasi penjumlahan dan perkalian dengan scalar.
- ▶ Syarat  $W$  disebut subruang dari  $V$  adalah:
  - $W \neq \{ \}$
  - $W \subseteq V$
  - Jika  $\vec{u}, \vec{v} \in W$  maka  $\vec{u} + \vec{v} \in W$
  - Jika  $\vec{u} \in W$  dan  $k \in R$  maka  $k\vec{u} \in W$



## Contoh 1:

- ▶ Tunjukkan bahwa himpunan  $W$  yang berisi semua matriks orde  $2 \times 2$  dimana setiap unsur diagonalnya adalah nol merupakan subruang dari ruang vektor matriks  $2 \times 2$

## Jawab:

- ▶  $0 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \in W$  maka  $W \neq \{\}$
- ▶ Jelas bahwa  $W \subseteq V$

- ▶ Ambil sembarang matriks  $A, B \in W$  maka

Perhatikan bahwa:

$$A + B = \begin{bmatrix} 0 & a_1 \\ a_2 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & b_1 \\ b_2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & a_1 + b_1 \\ a_2 + b_2 & 0 \end{bmatrix}$$

Ini menunjukkan bahwa  $A + B \in W$

- ▶ Ambil sembarang matriks  $A \in W$  dan  $k \in \text{Riil}$  maka

$$kA = k \begin{bmatrix} 0 & a_1 \\ a_2 & 0 \end{bmatrix} \in W$$

Ini menunjukkan bahwa  $kA \in W$

Jadi,  $W$  merupakan subruang dari  $M_{2 \times 2}$

## Contoh 2:

Periksa apakah himpunan  $D$  yang berisi semua matriks orde  $2 \times 2$  yang determinannya nol merupakan subruang dari ruang vektor  $M_{2 \times 2}$

## Jawab:

Ambil sembarang matriks  $A, B \in W$ . Dimana dipilih  $a \neq \pm b$ :

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ jelas bahwa } \det(A) = 0$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ b & a \end{bmatrix}, \text{ jelas bahwa } \det(B) = 0$$

► Perhatikan bahwa:

$$A + B = \begin{bmatrix} a & b \\ b & a \end{bmatrix}$$

Karena  $a \neq b$

Maka  $\det(A + B) = a^2 - b^2 \neq 0$

Jadi  $D$  bukan merupakan subruang Matriks berukuran  $2 \times 2$  karena tidak tertutup terhadap operasi penjumlahan

## Kombinasi Linear

- ▶ Sebuah vektor  $\vec{u}$  dinamakan kombinasi linear dari vektor-vektor  $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n$

Jika vektor  $\vec{u}$  tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk:

$$\vec{u} = k_1\vec{v}_1 + k_2\vec{v}_2 + \dots + k_n\vec{v}_n$$

dimana  $k_1, k_2, \dots, k_n$  adalah skalar Riil

## Contoh:

- ▶ Misal  $\vec{u} = (2,4,0)$  dan  $\vec{v} = (1,-1,3)$  adalah vektor-vektor di  $R^3$ .

Apakah vektor berikut merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor di atas

- $\vec{a} = (4,2,6)$
- $\vec{b} = (1,5,6)$
- $\vec{c} = (0,0,0)$

## Jawab:

a. Tulis  $k_1\vec{u} + k_2\vec{v} = \vec{a}$

Akan diperiksa apakah ada  $k_1, k_2$  sehingga kesamaan tersebut dipenuhi

$$k_1 \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 6 \end{bmatrix}$$

Persamaan diatas dapat dituliskan dalam bentuk perkalian matriks sebagai berikut:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & -1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 6 \end{bmatrix}$$

menggunakan OBE diperoleh:

$$\left[ \begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 2 \\ 4 & -1 & -6 \\ 0 & 3 & 6 \end{array} \right] \sim \dots \sim \left[ \begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Dengan demikian  $\vec{a}$  merupakan kombinasi linear dari vektor  $\vec{u}$  dan  $\vec{v}$  atau

$$\vec{a} = \vec{u} + 2\vec{v}$$

b. Tulis  $k_1\vec{u} + k_2\vec{v} = \vec{b}$

Akan diperiksa apakah ada  $k_1, k_2$  sehingga kesamaan tersebut dipenuhi

$$k_1 \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}$$

Persamaan diatas dapat dituliskan dalam bentuk perkalian matriks sebagai berikut:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & -1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}$$

menggunakan OBE diperoleh:

$$\left[ \begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 1 \\ 4 & -1 & 5 \\ 0 & 3 & 6 \end{array} \right] \sim \dots \sim \left[ \begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 9 \end{array} \right]$$

Baris terakhir pada matriks ini menunjukkan bahwa SPL tersebut tidak konsisten (tidak mempunyai solusi). Jadi, tidak ada nilai  $k_1$  dan  $k_2$  yang memenuhi persamaan tersebut. Oleh karena itu,  $\vec{b}$  tidak dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari  $\vec{u}$  dan  $\vec{v}$



c. Dengan memilih  $k_1 = 0$  dan  $k_2 = 0$  maka  $k_1\vec{u} + k_2\vec{v} = \vec{c}$



# Membangun Suatu Ruang Vektor

- ▶ Himpunan vektor

$$S = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n\}$$

dikatakan membangun suatu ruang vektor  $V$  jika setiap vektor pada  $V$  selalu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor di  $S$ .

Contoh:

Tentukan apakah

$$\vec{v}_1 = (1,1,2),$$

$$\vec{v}_2 = (1,0,1), \text{ dan}$$

$$\vec{v}_3 = (2,1,3)$$

Membangun  $R^3$

## Jawab:

- ▶ Ambil sembarang vektor di  $R^3$ , misalkan

$$\vec{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix}$$

Tulis:

$$\vec{u} = k_1 \vec{v}_1 + k_2 \vec{v}_2 + k_3 \vec{v}_3$$

Dalam bentuk perkalian matriks, persamaan tersebut dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix}$$

- ▶ Syarat agar  $\vec{u}$  dapat dikatakan kombinasi linear  $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3$  adalah SPL tersebut harus mempunyai solusi.
- ▶ Dengan OBE diperoleh:

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & u_1 \\ 0 & -1 & -1 & u_2 - u_1 \\ 0 & 0 & 0 & u_3 - u_1 - u_2 \end{array} \right]$$

Agar SPL itu konsisten haruslah  $u_3 - u_2 - u_1 = 0$

Ini kontradiksi dengan pengambilan vektor sembarang (unsur-unsurnya bebas, tak bersyarat)

Dengan demikian vektor-vektor tersebut tidak membangun  $R^3$

## Vektor Bebas Linear

- ▶ Misalkan  $S = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_n\}$  adalah himpunan vektor diruang vektor  $V$ .  $S$  dikatakan bebas linear (linearly independent) jika kombinasi linear:

$$k_1 \vec{u}_1 + k_2 \vec{u}_2 + \dots + k_n \vec{u}_n = \vec{0}$$

Hanya dipenuhi oleh

$$k_1 = 0, k_2 = 0, \dots, k_n = 0$$

## Contoh:

- ▶ Diketahui  $\vec{u} = (-1, 3, 2)$  dan  $\vec{a} = (1, 1, -1)$ . Apakah  $\vec{u}$  dan  $\vec{a}$  saling bebas linear di  $R^3$

## Jawab:

- ▶ Tulis

$$k_1\vec{u} + k_2\vec{a} = \vec{0}$$

Atau

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 3 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

- ▶ Menggunakan OBE dapat diperoleh:

$$\left[ \begin{array}{cc|c} -1 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \end{array} \right] \sim \dots \sim \left[ \begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Dengan demikian diperoleh:

$$k_1 = 0 \text{ dan } k_2 = 0$$

Ini berarti  $\vec{u}$  dan  $\vec{a}$  saling bebas linear

► Contoh:

Misalkan

$$\vec{a} = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}, \vec{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \vec{c} = \begin{bmatrix} 2 \\ -6 \\ -4 \end{bmatrix}$$

Apakah ketiga vektor diatas saling bebas linear

Jawab:

$$\vec{0} = k_1 \vec{a} + k_2 \vec{b} + k_3 \vec{c}$$

Atau

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & -6 \\ 2 & -1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$



► Dengan OBE diperoleh:

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \sim \dots \sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Ini menunjukkan bahwa

$k_1, k_2, k_3$  solusi tidak trivial ( $k_1, k_2, k_3$  tidak selalu 0)

Jadi

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  adalah vektor-vektor yang bergantung linear

## Basis

- ▶ Jika  $V$  adalah sembarang ruang vektor dan  $S = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_n\}$  merupakan himpunan berhingga dari vektor-vektor di  $V$ , maka  $S$  dinamakan basis bagi  $V$  jika kedua syarat berikut dipenuhi:
  - $S$  membangun  $V$
  - $S$  bebas linear

## Contoh:

- ▶ Tunjukkan bahwa himpunan matriks berikut:

$$M = \left\{ \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 3 & -6 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & -8 \\ -12 & -4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \right\}$$

Merupakan basis bagi matriks berukuran  $2 \times 2$

## Jawab:

- ▶ Tulis kombinasi linear:

$$k_1 \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 3 & -6 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} + k_3 \begin{bmatrix} 0 & -8 \\ -12 & -4 \end{bmatrix} + k_4 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

Atau

$$\begin{bmatrix} 3k_1 + k_4 & 6k_1 - k_2 - 8k_3 \\ 3k_1 - k_2 - 12k_3 - k_4 & -6k_1 - 4k_3 + 2k_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

- ▶ Dengan menyamakan setiap unsur pada kedua matriks, diperoleh SPL:

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 1 \\ 6 & -1 & -8 & 0 \\ 3 & -1 & -12 & -1 \\ -6 & 0 & -4 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \\ k_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix}$$

Determinan matriks koefisien = 48 determinan matriks koefisiennya tidak sama dengan 0 maka

- Ketika  $a = 0, b = 0, c = 0, d = 0$ , SPL Homogen punya solusi trivial yaitu  $k_1=0, k_2=0, k_3=0, k_4=0$  (bebas linear)
- SPL memiliki solusi untuk setiap  $a, b, c, d \in R$  (membangun)

Jadi, M bebas linear.

- ▶ Karena  $M$  bebas linear dan membangun  $M_{2 \times 2}$  maka  $M$  merupakan basis bagi  $M_{2 \times 2}$ .
- ▶ Ingat, basis untuk setiap ruang vektor adalah tidak tunggal

Contoh:

Untuk ruang vektor  $M_{2 \times 2}$ , himpunan matriks


$$\left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}$$

juga merupakan basisnya

## Dimensi

- ▶ Perhatikan matriks berikut:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$



Dengan melakukan OBE diperoleh

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Perhatikan kolom-kolom pada matriks hasil OBE

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Berdasarkan satu utama dari matriks  $A$ . Maka matriks  $A$  mempunyai **basis ruang kolom** yaitu:

$$\left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}$$

Jika  $A$  ditransposkan terlebih dahulu dan dilakukan OBE pada  $A^t$ , maka diperoleh

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1/2 \\ 0 & 1 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Perhatikan kolom-kolom pada matriks hasil OBE

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1/2 \\ 0 & 1 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Berdasarkan satu utama dari matriks  $A$ . Maka Matriks  $A$  tersebut mempunyai **basis ruang baris**:

$$\left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix} \right\}$$



*"Dimensi basis ruang baris-ruang kolom dinamakan rank"*

Jadi rank dari matriks A adalah 2.



- Basis Ruang Kolom
- Basis Ruang Baris
- Basis Ruang Solusi

## Contoh:

- ▶ Diberikan SPL homogen:

$$2p + q - 2r - 2s = 0$$

$$p - q + 2r - s = 0$$

$$-p + 2q - 4r + s = 0$$

$$3p - 3s = 0$$

Tentukan basis ruang solusi dari SPL diatas:

## Jawab:

SPL dapat ditulis dalam bentuk:

$$\left[ \begin{array}{cccc|c} 2 & 1 & -2 & -2 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -4 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & -3 & 0 \end{array} \right]$$

- ▶ Dengan melakukan OBE diperoleh

$$\left[ \begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

- ▶ Solusi SPL Homogen tersebut adalah

$$\begin{bmatrix} p \\ q \\ r \\ s \end{bmatrix} = a \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Dimana  $a, b$  merupakan parameter

- ▶ Jadi, basis ruang solusi dari SPL diatas adalah:

$$\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$$

Dimensi dari basis ruang solusi dinamakan nulitas.  
Dengan demikian, nulitas dari SPL diatas adalah 2.

## Latihan

- ▶ Nyatakan matriks  $\begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 0 & 8 \end{bmatrix}$

Sebagai kombinasi linear dari matriks berikut:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}, \text{ dan } \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$

- ▶ Periksa apakah himpunan berikut bebas linear!
  - $\{6 - x^2, 6 + x + 4x^2\}$
  - $\{1 + 3x + 3x^2, x + 4x^2, 5 + 6x + 3x^2, 7 + 2x - x^2\}$
- ▶ Periksa apakah himpunan  $A = \{6 - x^2, 6 + x + 4x^2\}$  membangun polinom orde 2?

- ▶ Periksa, apakah himpunan berikut merupakan basis bagi polinom orde 2
  - $\{4 + 6x + x^2, -1 + 4x + 2x^2, 5 + 2x - x^2\}$
  - $\{-4 + x + 3x^2, 6 + 5x + 2x^2, 8 + 4x + x^2\}$

- ▶ Misalkan

$$J = \{a + bx + cx^2 \mid a^2 = b^2 + c^2\}$$


Merupakan himpunan bagian dari ruang vektor polinom orde dua

Periksa apakah  $J$  merupakan subruang dari ruang vektor Polinom orde dua

Jika ya, tentukan basisnya



Fakultas Informatika  
School of Computing  
Telkom University



**THANK YOU**